

如何處理懷疑帶有炭疽菌的郵件

1. 處理這類事故時，請留意以下指引。
2. 切勿驚惶失措
 - 2.1 炭疽菌可引致皮膚、胃腸系統或肺部受到感染。處理成氣霧狀的炭疽菌經皮膚傷口進入人體，或被吞入或吸入人體後，才可令人受到感染。如皮膚有未癒合的傷口，宜貼上膠布遮蓋。接觸到炭疽菌孢子後，若能及早就醫，服用適當的抗生素，可以預防染上炭疽病。炭疽病不會經人體傳播。
 - 2.2 炭疽菌必須經過霧化處理成為極微細的粒子，才可成為傳播疾病的媒介。霧化的過程絕不簡單，既要有先進的技術，還要使用特別的設備。若吸入這些微粒，迅速診斷治理可以有效控制病情。
 - 2.3 要辨別可能帶有炭疽菌的郵件，並不容易。因此，郵務人員必須按常理作出判斷，或向上司請示。
3. 寫上恐嚇字句(如內有炭疽菌 **Anthrax**)而未經打開的可疑信件或郵包
 - 3.1 切勿搖晃或倒出可疑信封或郵包內的物品。
 - 3.2 將信封或郵包放進膠袋或其他容器，以防內載物品漏出。
 - 3.3 如沒有容器可供使用，可用衣服、紙張、廢紙箱等物件覆蓋信封或郵包，切勿把覆蓋物移開。
 - 3.4 然後離開房間，關上房門，或封鎖有關範圍，以防有人進入。
 - 3.5 用肥皂和熱水洗手，以防粉末沾上面部。
 - 3.6 立即向上司報告，由上司報警。
 - 3.7 關掉現場的所有風扇及空調。
 - 3.8 上司須列出發現此可疑信件或郵包時所有在場人士的名單，然後將名單交予警方跟進調查，並聽候警方的指示。



4. 內載粉末的信封和灑落的粉末
 - 4.1 切勿試圖清理粉末。小心切勿讓粉末散播到空氣中。如情況許可，以濕毛巾覆蓋灑落的粉末。
 - 4.2 關掉現場的所有風扇及空調。
 - 4.3 然後離開房間，關上房門，或封鎖有關範圍，以防有人進入。
 - 4.4 立即向上司報告，由上司報警。
 - 4.5 上司須列出發現此可疑信件或郵包時所有在場(在房間內或在 15 呎範圍內)人士的名單，然後將名單交予警方跟進調查，並聽候警方的指示。上述人士應在安全(最好是在設有沖洗設施)的地方集合，等候警方到場處理，切勿在樓宇內到處走動，以免污染其他地方。
 - 4.6 用肥皂和熱水洗手，以防粉末沾上面部。
 - 4.7 如懷疑有粉末沾在衣物上，應脫下全身衣物放進膠袋，然後盡快用肥皂和熱水沖身。切勿讓漂劑或其他消毒劑接觸皮膚。
 - 4.8 警方到場後會評估情況。若相信這些粉末可能是生物劑(例如炭疽菌)，便會按需要安排消毒程序和跟進治療。警方到場之前，不要飲食。避免觸摸面部。切勿警惶失措。萬一這些粉末真的是炭疽菌(這個可能性極低)，若能在接觸後數小時內接受治療，療效會非常高。

